



## **Alvedon**

500 mg tabletter

### **Användarinformation**

Observera att läkare kan ha ordinerat Alvedon för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination.

### **Vad innehåller Alvedon?**

1 tablett innehåller:

*Verksamt ämne:* paracetamol 500 mg.

*Övriga innehållsämnen:* pregelatiniserad stärkelse, kroskarmellosnatrium, povidon, stearinsyra.

### **Hur verkar Alvedon?**

Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.

### **Innehavare av försäljningstillstånd**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå

Box 5719

114 87 Stockholm

### *Information lämnas av*

Sofus Stockholm Consulting AB

Västmannagatan 4

111 24 Stockholm

Tel: 08-21 54 45

## Vad används Alvedon mot?

Alvedon används:

- mot värk och smärtor av olika slag, t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärter, muskelsmärter och reumatiska smärtor
- vid feber, t ex vid förkylningar.

Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

## När ska Alvedon inte användas?

Använd inte Alvedon om du är överkänslig mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne.

## Detta ska du tänka på innan och när du använder Alvedon

Tag aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningen. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotek.

*Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så fort som möjligt om du har tagit för stor dos.*

*Risken för denna typ av leverskada ökar vid alkoholmissbruk.*

Använd inte Alvedon utan läkarens ordination om du har alkoholproblem eller leverskada. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon.

## Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.



## Amning

Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon under amning.

## Trafik och maskiner

Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

## Påverkan av andra läkemedel/naturläkemedel

Behandlingen med Alvedon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel. Kontakta därför apotekspersonal eller läkare innan du använder Alvedon tillsammans med något av följande läkemedel/naturläkemedel:

- warfarin (blodförtunnande läkemedel). Enstaka doser av Alvedon anses inte påverka effekten av warfarin. Ta högst 2 tabletter Alvedon (à 500 mg) per dygn under 5 dagar i följd, för vuxen. Behöver du ta mer kontakta läkare först.
- probenecid (läkemedel mot gikt)
- fenytoin (läkemedel mot epilepsi)
- fenobarbital (läkemedel mot epilepsi)
- karbamazepin (läkemedel mot epilepsi)
- rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)
- kolestyramin (läkemedel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.
- kloramfenikol för injektion (läkemedel vid bakterieinfektioner). Kloramfenikol mot infektioner i ögat och Alvedon kan användas samtidigt.
- johannesörtextrakt (ingår i vissa naturläkemedel)



## Doseringsanvisning

För att få bästa effekt är det viktigt att följa angiven dosering.

*Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.*

Om läkare inte gett dig annan dosering ska du följa doseringen nedan.

*Vuxna:*

Alvedon ska ej användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.

*Barn:*

Till barn ska doseringen i första hand beräknas efter barnets vikt.

Använd inte Alvedon till barn i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.

*Vuxna och barn över 40 kg (från ca 12 år):* 1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.

*Barn:*

*Barn 25-40 kg (ca 7-12 år):* ½-1 tablett var 4-6 timme, högst 4 tabletter per dygn.

*Barn 15-25 kg (ca 3-7 år):* ½ tablett var 4-6 timme, högst 2 tabletter per dygn.

## Vad ska du göra om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor dos Alvedon kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

*Det finns risk för leverskada även om du mår bra.*

För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.

## Biverkningar

Biverkningar kan förekomma, men det är inte säkert att du får någon av dem.



*Sällsynta* (färre än 1 person av 1000 drabbas): Hudutslag, leverskada, nedsatt njurfunktion. Allergiska reaktioner såsom nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, ibland med andnöd och sväljningssvårigheter (angioödem).

Vid allergiska reaktioner bör du sluta ta Alvedon och ta kontakt med läkare. Leverskada kan uppträda vid användning av paracetamol i samband med alkoholmissbruk. Om du använder Alvedon under lång tid kan risk för njurskador inte helt uteslutas.

## **Hållbarhet**

Används före det utgångsdatum som står på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek.

Senaste revision. 2009-06-03