

**Otrivin®****Novartis***Nässpray, lösning 1 mg/ml*

Klar, färglös lösning

Avsvällande nässpray

Aktiv substans:

**Xylometazolin****M  
Receptfritt AD  
Förmån**

ATC-kod:

**R01AA07**

Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

**Innehåll**

Otrivin är en nässpray som innehåller det verksamma ämnet xylometazolinhydroklorid. 1 ml nässpray innehåller 1 mg xylometazolinhydroklorid. Övriga ämnen förutom det verksamma är benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid och renat vatten.

**Verkningsätt**

Otrivin har avsvällande effekt.

**Användningsområde**

För behandling av förkylningssnuva med nästäppa.

**Skall inte användas**

Otrivin skall inte användas av personer som

— har fått hypofysen bortopererad

— är överkänsliga mot något av ingående ämnen.



## Försiktighet

Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Otrivin utan att först ha talat med läkare.

## Graviditet

Kan användas av gravida kvinnor.

## Amning

Kan användas av ammande kvinnor.

## Trafikvarning

Otrivin påverkar inte förmågan att köra bil eller sköta maskiner.

## Att tänka på vid användning

Behandlingen med Otrivin kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotilin) antidepressiva läkemedel. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning.

## Dosering

Otrivin ska inte användas i mer än 10 dagar i följd. Vid användning under lång tid kan Otrivin ge nästäppa eller återigen framkalla snuva.

*Vuxna och barn över 10 år:* 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen.

Annan dos enligt läkares föreskrift.

Effekten märks inom några minuter och varar i upp till 10 timmar.

### *Bruksanvisning*

1. Snyt ur näsan. Ta av den genomskinliga plasthatten.



2. Innan sprayen används för första gången, pumpa ett par gånger i luften så att en jämn dusch erhålls.
3. För in spetsen i ena näsborren och pumpa 1 gång. Upprepa proceduren i den andra näsborren.

## Överdoser

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

## Biverkningar

Vanliga biverkningar för Otrivin (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är sveda i näsan, irriterad eller torr nässlemhinna.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) är huvudvärk och illamående. Enstaka fall av hudutslag och övergående dimsyn har rapporterats.

## Förvaring och hållbarhet

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Överbliven eller för gammal medicin kan lämnas till apotek för förstöring.

## Miljöpåverkan

*Xylometazolin*

Miljörisk: Tillgängliga ekotoxikologiska data utesluter inte risk för miljöpåverkan.

## Förpackningsinformation

*Nässpray, lösning 1 mg/ml* Klar, färglös lösning



10 milliliter flaska, receptfri, AD (fri prissättning), läkemedelsförmån  
med recept: 57:50

*Texten är baserad på bipacksedel: 2009-05-25.*