

## Otrivin®

1 mg/ml nässpray, lösning

Läkare kan ordinera läkemedlet för annat användningsområde eller med annan dosering än vad som framkommer i informationen. Följ alltid läkarens rekommendationer och anvisningarna på förpackningen.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad är Otrivin® och vad används det för?
2. Innan du använder Otrivin®
3. Hur du använder Otrivin®
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Otrivin®

### **Vad innehåller Otrivin® ?**

Otrivin är en nässpray som innehåller det verksamma ämnet xylometazolinhydroklorid. 1 ml nässpray innehåller 1 mg xylometazolinhydroklorid. Övriga ämnen förutom det verksamma är benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid och renat vatten.

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

Novartis Sverige AB

Box 1150

183 11 Täby

Tel. 08-732 32 00

## Tillverkare

# 1. VAD ÄR OTRIVIN® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

## Läkemedelsgrupp

Otrivin har avsvällande effekt.

## Vad används Otrivin® för?

För behandling av förkylningssnuva med nästäppa.

# 2. INNAN DU ANVÄNDER OTRIVIN®

## Använd inte Otrivin® :

Otrivin skall inte användas av personer som

- har fått hypofysen bortopererad
- är överkänsliga mot något av ingående ämnen.

## Var särskilt försiktig med Otrivin®

Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Otrivin utan att först ha talat med läkare.

## Graviditet

Kan användas av gravida kvinnor.

## Amning

Kan användas av ammande kvinnor.



## **Körförmåga och användning av maskiner**

Otrivin påverkar inte förmågan att köra bil eller sköta maskiner.

## **Användning av andra läkemedel**

Behandlingen med Otrivin kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotilin) antidepressiva läkemedel. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning.

## **3. HUR DU ANVÄNDER OTRIVIN®**

### **Doseringsanvisning**

Otrivin ska inte användas i mer än 10 dagar i följd. Vid användning under lång tid kan Otrivin ge nästäppa eller återigen framkalla snuva.

*Vuxna och barn över 10 år:* 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen.

Annan dos enligt läkares föreskrift.

Effekten märks inom några minuter och varar i upp till 10 timmar.

### **Administrering**

#### *Bruksanvisning*

1. Snyt ur näsan. Ta av den genomskinliga plasthatten.
2. Innan sprayen används för första gången, pumpa ett par gånger i luften så att en jämn dusch erhålls.
3. För in spetsen i ena näsborren och pumpa 1 gång. Upprepa proceduren i den andra näsborren.

## **Om du använder mera Otrivin® än du borde**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

## **4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR**

Vanliga biverkningar för Otrivin (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är sveda i näsan, irriterad eller torr nässlemhinna.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) är huvudvärk och illamående. Enstaka fall av hudutslag och övergående dimsyn har rapporterats.

## **5. FÖRVARING AV OTRIVIN®**

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Överbliven eller för gammal medicin kan lämnas till apotek för förstöring.

**Denna bipacksedel godkändes senast den 2009-05-25**