

Corsodyl

Munhålelösning 2 mg/ml

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller Corsodyl?

Det verksamma ämnet i lösningen är klorhexidindiglukonat 2 mg/ml. Dessutom innehåller läkemedlet etanol 96%, hydrerad polyoxylricinolja, ickekristalliserande sorbitol 70%, pepparmyntolja och renat vatten.

Hur verkar Corsodyl?

Bakteriedödande munvårdsmedel.

Innehavare av försäljningstillstånd

SmithKline Beecham plc
980 Great West Road
Brentford
Middlesex TW8 9GS
Storbritannien

Tillverkare

SmithKline Beecham Consumer Healthcare
Norrey's Drive
Maidenhead
Berkshire
Storbritannien

Information lämnas av

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Arne Jacobsens Allé 15
DK-2300 København S
Danmark

Kontaktes via:

GlaxoSmithkline Consumer Healthcare A/S
Box 5196
200 71 Malmö
020-22 66 70

Vad används Corsodyl för?

Corsodyl används som bakteriedödande medel före och efter operationer i munhålan. Tillfälligt vid inflammation i munslemhinnan hos protesbärare. Vidare används Corsodyl då mekanisk rengöring av munhålan och tänder är försvårad såsom vid kortvarig sjukdom, olycksfall, stark kariesbildning, tandköttsinflammation och tandlossning. Lösningen kan även används vid komplicerad, fast ortodontisk apparatur.

När ska Corsodyl inte användas?

Corsodyl skall inte användas av personer som är överkänsliga mot klorhexidin eller mot något annat innehållsämne.

Att tänka på innan och under tiden du använder Corsodyl

Undvik kontakt med ögon och öron. Om Corsodyl av misstag kommer i ögonen, skölj omgående och noggrant med vatten.

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.



Amning

Inga kända risker vid användning under amning.

Trafikvarning

Ingen känd påverkan.

Hur ska du använda Corsodyl?

Dosering om läkare eller tandläkare ej föreskrivit annat:

Munnen sköljes 2 gånger dagligen med ca 10 ml lösning under minst 1 minut. Lösningen skall därefter spottas ut. Vid kirurgi i munnen användes Corsodyl lösning 5 dagar före och 5 dagar efter operationen. Vid tandkirurgi användes Corsodyl lösning efter operationen under 1-3 veckor.

Corsodyl användes efter tandborstning med tandkräm och inte innan. Munnen bör sköljas noggrant med vatten efter tandborstning. Annars kan rester av tandkrämen motverka effekten av klorhexidin. Missfärgning av tänderna kan uppstå men kan ofta motverkas genom att man använder Corsodyl t ex på kvällen och vanlig tandkräm på morgonen.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om Du har fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

Vilka biverkningar kan Corsodyl ge?

Den vanligaste biverkan är missfärgning av tunga/tänder.

Vanliga biverkningar (forekommer hos fler än 1 av 100 användare) är: brun missfärgning på tunga/tänder, förändringar i smakupplevelsen, brännande känsla på tungan.

Mindre vanliga biverkningar (forekommer hos färre än 1 av 1000 användare) är: inflammation i munslemhinnan

Sällsynta biverkningar (forekommer hos färre än 1 av 1000 användare) är: allergiska reaktioner, hudirritation och inflammation i öronspottkörteln.

Missfärgningen av tungan är inte skadlig och försvinner efter avslutad behandling. Vid behov kan missfärgningen på tänder poleras bort.

Förändringar i smakupplevelsen och en brännande känsla på tungan kan uppträda när behandlingen inleds, men dessa effekter avtar vanligen vid fortsatt användning. Om dessa eller andra biverkningar utvecklas bör läkare konsulteras.

Hur ska Corsodyl förvaras?

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Senaste revision. 2006-03-31