

Ipren 200 mg filmdragerade tabletter och Ipren 400 mg filmdragerade tabletter

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt).

Vad innehåller läkemedlet?

Verksamt ämne: Ibuprofen 200 mg eller 400 mg

Övriga innehållsämnen: Vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin

cellulosa, hypromellos, polydextros (E1200), polyetylenglykol 4000.

Hur verkar läkemedlet?

Ipren tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

Ipren verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Effekt fås i regel inom 30 minuter och maximal effekt nås inom 1-2 timmar.

Innehavare av godkännande för försäljning/Information lämnas av:

McNeil Sweden AB

169 90 Solna

Tel: 08-5033 85 00

med-info.sweden@conse.jnj.com



Vad används läkemedlet för?

Vid lätta till måttliga smärttillstånd, t ex huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk. Feber vid förkylningssjukdomar. Vid menstruationssmärter. Tablett 400 mg används dessutom vid ledförändringar (artros) samt ledgångsreumatism (reumatoid artrit).

När ska läkemedlet inte användas?

Ska inte användas av dem som är överkänsliga (allergiska) mot aktivt innehållsämne eller övriga innehållsämnen. Ska inte användas av dem som fått överkänslighetsreaktion såsom astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber av ibuprofen, acetylsalicylsyra eller vissa andra medel mot inflammation. Detsamma gäller personer med ökad risk för blödningar, magsår eller tolvfingertarmsår eller som tidigare haft återkommande magsår eller blödningar. Svår hjärt-, lever- eller njursjukdom.



Att tänka på innan och när läkemedlet används

Lägsta dos ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar.

Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Använd inte flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare.

Ipren 200 mg ges ej till barn under 6 år.

Ipren 400 mg ges ej till barn under 12 år.

Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.

Vid följande sjukdomar bör du rådgröra med läkare innan behandling med Ipren påbörjas: Sjukdomar med ökad blödningstendens, inflammatorisk tarmsjukdom, SLE (bindvävssjukdom), astma, nedsatt njur- eller leverfunktion, högt blodtryck samt lätt till måttlig hjärtsvikt. Även den som har haft magsår eller tolvfingertarmsår bör rådfråga läkare.

Läkemedel som Ipren kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (t ex om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).

Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.

Särskilt i början av behandlingen ska patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken.

Ipren kan, som många andra antiinflammatoriska läkemedel (sk NSAID),

försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig, dvs upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Graviditet

Intag av Ipren ska undvikas av kvinnor som försöker bli eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

Amning

Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ipren under amning.

Trafikvarning

Vid behandling med Ipren kan biverkningar som synrubbningar förekomma. Detta är



ovanligt, men man bör tänka på det vid tillfällena då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad ska du undvika när du använder detta läkemedel

Vissa medel som motverkar blodets koagulation (levrande) (t ex acetylsalicylsyra, warfarin, tiklopidin), vissa medel mot förhöjt blodtryck (ACE-hämmare t ex kaptopril, betareceptorblockerande medel, angiotensin II antagonister), vissa urindrivande medel



(t ex tiazider, tiazidbesläktade medel och Loop-medel), kortikosteroider, vissa medel mot cancer och rubbningar i immunsystemet (antimetaboliter t ex metotrexat), vissa immunsuppressiva medel mot avstötning (t ex ciklosporin, takrolimus), vissa medel mot psykos (t ex litium), och depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare även kallade SSRI-preparat), vissa medel mot feber och smärta (t ex acetylsalicylsyra) och även vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Ipren. Rådgör därför alltid med läkare innan du använder Ipren tillsammans med andra läkemedel.

Hur ska du använda läkemedlet?

Ipren tabletter 200 mg

Lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar. Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 1-2 tabletter (200-400 mg) som enkeldos eller 3-4 gånger per dygn dock högst 6 tabletter (1200 mg) per dygn.

Mer än 2 tabletter (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt.

Barn 6-12 år (över 20 kg): 1 tablett (200 mg)
1-3 gånger per dygn.

Om inte tillståndet förbättrats inom 5 dagar, kontakta läkare.

Menstruationssmärter. Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 2 tabletter (400 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.

Ipren tabletter 400 mg

Lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar. Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 1 tablett (400 mg) som enkeldos eller 2-3 gånger per dygn dock högst 3 tabletter (1200 mg) per dygn. Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt.

Om inte tillståndet förbättrats inom 5 dagar, kontakta läkare.



Menstruationssmärter. Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 1 tablett (400 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.

Reumatiska sjukdomar. Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten och med hänsyn till sjukdomstillståndet. Vanlig dos för vuxna: 3-5 tabletter (1200-2000 mg) per dygn fördelat på 3-4 doser. Högsta dygnsdosen är 6 tabletter (2400 mg). Vid morgonstelhet får man snabbare effekt om morgondosen tas på fastande mage.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Vanligast är milda biverkningar från mag-tarmkanalen som förekommer hos ca 5 patienter av 100. Vid tillfällig användning i receptfri dos, maximalt 1200 mg per dygn, är biverkningar mindre vanliga.

Vanliga (hos fler än 1 av 100): Trötthet, huvudvärk. Magbesvär, diarré, illamående, kräkningar (besvären minskar i regel om man tar Ipren tillsammans med mat). Hudutslag.

Mindre vanliga (hos färre än 1 av 100): Allergiska reaktioner (astma, nässelutslag, hösnuva, slemhinnesvullnad i mun och hals). Blödning från mag-tarmkanalen. Magsår. Sömnlöshet, lätt oro. Synrubbningar eller hörselpåverkan, som försvinner när behandlingen avbryts.

Sällsynta (hos färre än 1 av 1000): Vätskeansamling (ödem), minskat antal blodplättar eller vita blodkroppar. "Brustet

magsår". Lever- och njurpåverkan.
Överhudsavlossning (epidermal nekrolys),
hudrodnad (erythema multiforme).
Hjärnhinneinflammation utan bakteriell orsak
(i de flesta fall där hjärnhinneinflammation
rapporterats har någon form av autoimmun
grundsjukdom förelegat). Depression.
Förvirring. Nedsatt synförmåga.
I sällsynta fall förekommer allvarliga
hudinfektioner i samband med vattkoppor.
Förstoppning, väderspänning, högt blodtryck,
hjärtsvikt samt allvarliga hudreaktioner
(såsom Stevens Johnsons syndrom och toxisk
epidermal nekrolys) har rapporterats i mycket
sällsynta fall i samband med användning av
antiinflammatoriska medel (NSAID).
Läkemedel som Ipren kan medföra en liten
ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.
Sluta ta Ipren och kontakta läkare omedelbart
om svullnad av bl a ansikte, tunga och/eller
svalg, och/eller svårighet att svälja eller

nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem). Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Ipren och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.

Hur ska läkemedlet förvaras?

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Senaste revision. 2009-06-23