

Sotalol Mylan 40 mg tabletter, Sotalol Mylan 80 mg tabletter, Sotalol Mylan 160 mg tabletter

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i användarinformationen. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller läkemedlet?

Verksamt ämne: sotalolhydroklorid 40 mg, 80 mg respektive 160 mg.

Övriga innehållsämnen: dibasisk kalciumfosfat, majsstärkelse, talk, povidon, natriumstärkelseglykollat, magnesiumstearat.

Hur verkar läkemedlet?

Sotalol Mylan är en så kallad beta-receptorblockerare.

Sotalol Mylan minskar stresshormoners effekt på hjärtat i samband med psykisk spänning och fysiskt arbete. Det leder till att hjärtat slår långsammare (pulsen minskar) och pumpar ut mindre mängd blod per minut, varvid även blodtrycket sjunker.

Innehavare av försäljningstillståndet/Information lämnas av

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tel: 08 555 227 50, Fax: 08 555 227 51, E-
post: inform@mylan.se

Vad används läkemedlet för?

Sotalol Mylan används mot oregelbunden hjärtverksamhet.



När skall läkemedlet inte användas?

Sotalol Mylan skall inte användas vid överkänslighet mot sotalol eller något hjälpämne, vid astma och andra andningsbesvär, vissa typer av störningar av hjärtats elektriska impulser, lågt blodtryck som inte beror på oregelbunden hjärtverksamhet, svåra cirkulationsrubbningar eller vid kraftigt nedsatt njurfunktion. Skall inte heller användas vid en speciell sorts tumör i binjuremärgen (feokromocytom) eller vid en rubbning av ämnesomsättningen som ger ett överskott av sura ämnen i kroppen (metabolisk acidosis).

Att tänka på innan och när läkemedlet används

De som har sockersjuka (diabetes), nedsatt njurfunktion, nedsatt sköldkörtelfunktion, psoriasis, astmatiska sjukdomar eller som nyligen har haft en hjärtinfarkt bör rådgöra

med läkare innan behandling med Sotalol Mylan påbörjas. Sotalol Mylan kan även i sällsynta fall förvärra symptomen av psoriasis.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare *före* användning av Sotalol Mylan under graviditet.

Amning

Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Sotalol Mylan under amning annat än på bestämd ordination av läkare.

Trafikvarning

Sotalol Mylan påverkar vanligtvis inte reaktionerna och körförmågan. Var uppmärksam på att det finns risk för att drabbas av trötthet och yrsel, särskilt i början av behandlingen.



Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?

Det bör gå minst två timmar mellan intag av Sotalol Mylan och vissa läkemedel mot sur mage och halsbränna (antacida som innehåller magnesium eller aluminiumhydroxid), eftersom det annars finns risk för att effekten av sotalol minskar.

Behandlingseffekten kan även påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa läkemedel mot hjärtbesvär och/eller blodtryckssänkande och vätskedrivande läkemedel (digitalis, diltiazem, klass I- eller klass III antiarytmika, klonidin, nifedipin, loop-diuretika, tiazider, verapamil), vissa mediciner mot depression (tricykliska antidepressiva medel), läkemedel som används vid diabetes (insulin och sulfonureider), vissa läkemedel som används vid akuta astma och/eller allergianfall (adrenalin/epinefrin) samt även vissa andra läkemedel. Behandlande



läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

Inför bedövning i samband med tandbehandling är det också viktigt att upplysa tandläkaren att du använder sotalol, eftersom lokalbedövningsmedel för injektion kan innehålla adrenalin/epinefrin.

Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Sotalol Mylan bör tas åtminstone 1 timme före måltid eftersom upptaget av medicinen annars kan reduceras. Behandlingen inleds vanligen med 1 tablett à 40 mg 2 gånger dagligen eller 1 tablett à 80 mg en gång dagligen. Läkaren ökar sedan ofta dosen successivt, vanlig dos efter en tids behandling är därför 1 tablett à 80 mg eller 160 mg 2 gånger dagligen.

Om behandlingen skall upphöra bör dosen sänkas långsamt under 1-2 veckor, speciellt

vid kärlekskramp. Rådgör med din läkare. Ändra dock aldrig själv på den dos som förskrivits.

Vad skall man göra om man tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Biverkningarna övergår oftast efter en tids behandling. Kontakta läkare vid långvariga eller besvärande biverkningar, eftersom dosen då kan behöva sänkas.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Illamående och kräkningar, matsmältningsrubbningar med magsmärtor, diarré och gasbildning. Feber. Myrkrypningar, muskelkramp. Trötthet, andfåddhet, svaghetskänsla, huvudvärk. Sömnstörningar och mardrömmar, nedstämdhet, ångest.



Sexuell oförmåga. Långsam hjärtrytm och lågt blodtryck, vilket kan yttra sig som yrsel, svimningskänsla eller orsaka svimning. Hjärtklappning, hjärtsvikt, bröstsmärta. Hudutslag. Förändrade syn-, hörsel- eller smakupplevelser.

Hållbarhet

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Senaste revision. 2008-05-22