



1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

GINK□YO, filmdragerad tablett

2 VAD INNEHÅLLER GINK□YO?

En tablett innehåller följande beståndsdelar:

Den verksamma beståndsdelan är extrakt LI1370 (50:1) av *Ginkgo biloba* L. blad 50 mg (motsvarande 12,5 mg ginkgoflavonglykosider och 3 mg ginkgolider och bilobalid).

Övrigt innehåll: laktosmonohydrat 134 mg, cellulosapulver, citronsyra, talk, kiseldioxid, magnesiumstearat, eudragit, ricinolja, sackarinnatrium, vanillin.

Färgämne: järnoxid (E 172).

Vid tillverkning av 1 tablett åtgår 2,5 g *Ginkgo biloba* blad.

3 HUR VERKAR GINK□YO?

Gink□Yo befrämjar blodcirkulationen.

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

Lichtwer Healthcare GmbH & Co. KG

Wallenroder Strasse 8-10

D-13435 Berlin

Tyskland

Boehringer Ingelheim AB

Consumer Health Care

Box 47 608

117 94 Stockholm

Telefon 08-721 21 00

Telefax 08-721 21 88

E-post info@receptfritt.nu

5 VAD ANVÄNDS GINK□YO FÖR?

Naturläkemedel för behandling av långvariga symtom hos äldre människor såsom minnesbesvär, svårigheter att koncentrera sig, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla. Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

6 NÄR SKA GINK□YO INTE ANVÄNDAS?

Dokumentation för ställningstagande till detta saknas.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR GINK□YO ANVÄNDS:

Personer som regelbundet använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (t ex antikoagulantia och acetylsalicylsyra) bör rådgöra med sin läkare före användning av Gink□Yo.

På grund av ökad risk för blödning bör man inte använda Gink□Yo under veckorna före planerad operation.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion eller andra sjukdomar innebär att försiktighet bör iaktas vid behandling.

GRAVIDITET

Användning under graviditet kan inte rekommenderas

AMNING

Användning vid amning kan inte rekommenderas.

TRAFIKVARNING

Inga kända risker

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER GINK□YO?

Effekten av blodförtunnande preparat kan förstärkas om ginkgo biloba används samtidigt. Du bör därför rådfråga din läkare om du tar blodförtunnande preparat. Effekten av samtidigt intag av andra naturläkemedel, läkemedel eller föda är inte studerad.

Vuxna: 1-2 tabletter 2 gånger dagligen. Rekommenderas ej till barn. Tabletterna tas med vätska i samband med måltid.

VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS?

Om Du fått i Dig för stor mängd Gink-Yo kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel 112.

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN GINK□YO GE?

Kontakta läkare om du misstänker att Gink□Yo gett dig allvarliga biverkningar.

Lindriga mag- och tarmbesvär, huvudvärk, allergiska hudreaktioner.

9 HUR SKA GINK□YO FÖRVARAS?

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Överbliven eller för gammal medicin kan lämnas till apotek för förstöring.

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR GINK□YO?

Används före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2007-08-21

