

**Oculac®****Novartis Healthcare***Ögondroppar, lösning 50 mg/ml*  
Svagt gulaktig, klar vattenlösning.

Tårsubstitut

Aktiv substans:

**Povidon****M**  
**Receptfritt AD**  
**Förmån**

ATC-kod:

**S01XA20**

Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

**Innehåll**

Oculac ögondroppar innehåller povidon K25 som aktiv substans. Varje ml innehåller 50 mg povidon K25. Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), borsyra, kalciumklorid, kaliumklorid, magnesiumklorid, natriumklorid, natriumlaktat natriumhydroxid (för justering av pH-värdet) och vatten för injektionsvätskor.

**Verkningsätt**

Den aktiva substansen i Oculac heter povidon K25. Oculac ögondroppar är till för att fukta och smörja ögonen.

**Användningsområde**

Dropparna används för att lindra besvär som beror på torra ögon.

**Skall inte användas**

om du är allergisk (överkänslig) mot povidon K25 eller mot något av övriga innehållsämnen i Oculac (se avsnitt 6. Övriga upplysningar,



Innehållsdeklaration). Rådfråga läkare om du misstänker eventuell allergi.

## **Försiktighet**

Oculac innehåller bensalkoniumklorid som konserveringsmedel. Detta ämne kan ge upphov till ögonirritation. Om du använder kontaktlinser ska du avlägsna dem före applikation av Oculac, eftersom ögondropparna kan missfärga mjuka kontaktlinser. Vänta minst 30 minuter innan du sätter in linserna igen.

## **Graviditet**

Om du är, eller tror dig vara gravid ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

## **Amning**

Om du ammar, ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

## **Trafikvarning**

Oculac kan göra ditt synfält grumligt (förorsaka dimsyn). Om detta händer dig, ska du vänta tills synfältet är klart igen innan du kör bil eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.



## Att tänka på vid användning

Om du använder andra ögonläkemedel tillsammans med Oculac, ska du göra ett uppehåll på minst 5 minuter mellan de olika läkemedlen och applicera Oculac till sist.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

## Dosering

Använd alltid Oculac enligt läkarens anvisningar eller enligt de anvisningar som ges i denna bipacksedel.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

En vanlig dos är 1 droppe i vardera ögat 4 gånger dagligen eller vid behov.

1. Tvätta händerna.
2. Öppna flaskan. Vidrör inte flaskans spets efter att du öppnat den eftersom detta kan kontaminera lösningen.
3. Böj huvudet bakåt (Bild 1).
4. Dra det nedre ögonlocket nedåt med ett finger och håll droppflaskan i din andra hand. Spetsen på flaskan får inte vidröra ögat, eftersom detta kan skada ögat. Tryck på flaskan så att en droppe faller i ögat. (Bild 2).
5. Slut ögat och tryck en finger-topp mot ögats inre vrå i 1-2 minuter. Detta förhindrar att droppen rinner genom tårkanalen ner i svalget, och gör att en större del av droppen blir kvar i ögat (Bild 3). Upprepa vid behov steg 3-5 för ditt andra öga.
6. Stäng flaskan efter varje användning.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **Biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan Oculac orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats:

### **Vanliga (förekommer hos fler än 1 användare av 100):**

- lindrig, övergående sveda eller klubbig känsla i ögat.

### **Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 användare av 10 000):**

- irritation
- överkänslighetsreaktioner.

Dessutom har enstaka patienter också upplevt följande biverkning i samband med bruk av Oculac ögondroppar:

- dimsyn

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **Förvaring och hållbarhet**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.



Själva flaskan med ögondroppar är inte steril, men innehållet i flaskan bevarar sin sterilitet fram till det att flaskan öppnas. Ögondropparna måste sedan användas inom 4 veckor efter det att flaskan öppnats för första gången.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och flaskan (Utg. dat./EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **Miljöpåverkan**

*Povidon*

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av povidon kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

## **Förpackningsinformation**

*Ögondroppar, lösning 50 mg/ml* Svagt gulaktig, klar vattenlösning. 10 milliliter flaska, receptfri, AD (fri prissättning), läkemedelsförmån med recept: 53:50

*Texten är baserad på bipacksedel: N/A.*