



## **Cefadroxil Sandoz**

Filmdragerade tabletter 1 g

*Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ därför alltid läkarens ordination.*

## **Vad innehåller Cefadroxil Sandoz?**

*Verksamt ämne:* Cefadroxil monohydrat motsvarande cefadroxil 1g.

*Övrigt:* Vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, makrogol 6000, krospovidon, povidon, talk, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, titandioxid (färgämne E 171).

## **Hur verkar Cefadroxil Sandoz?**

Cefadroxil Sandoz är ett antibiotikum (antibakteriellt medel) som tillhör gruppen cefalosporiner. Cefadroxil Sandoz hindrar

bakterierna från att bilda nya cellväggar och har därmed bakteriedödande effekt.

## **Innehavare av försäljningstillstånd**

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250  
Kundl, Österrike

## **Information lämnas av**

Sandoz AB, Berga Allé 1E, 254 52  
Helsingborg

## **Vad används Cefadroxil Sandoz för?**

Cefadroxil Sandoz används vid behandling av urinvägsinfektioner, infektioner i hud- och mjukdelar, halsfluss och lunginflammation.

## **När ska Cefadroxil Sandoz inte användas?**

Använd inte Cefadroxil Sandoz om du tidigare visat överkänslighet för cefalosporingruppens



antibiotika eller mot något innehållsämne i Cefadroxil Sandoz.

## **Att tänka på innan och under tiden du använder Cefadroxil Sandoz**

Om du är allergisk mot vanliga penicilliner ska du tala om detta för läkaren innan du börjar med Cefadroxil Sandoz.

Diabetiker bör observera att under behandlingen med cefadroxil kan en falsk positiv reaktion för glukos i urinen uppträda när man använder Benedict's eller Fehling's lösningar, kopparsulfat eller Clinitest, men inte om man använder enzymtest som Clinistix.

## **Graviditet**

Du kan använda Cefadroxil Sandoz även om du är gravid.

## **Amning**

Det verksamma ämnet i Cefadroxil Sandoz går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkaren innan du börjar med Cefadroxil Sandoz om du ammar.

## **Trafikvarning**

Cefadroxil Sandoz påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner.

## **Vad skall du undvika när du använder Cefadroxil Sandoz?**

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel såsom p-piller, vissa typer av antibiotika, probenecid (medel vid gikt) och olika typer av medel som förhindrar att blodet leverar sig. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

## Hur ska du använda Cefadroxil Sandoz?

Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på vilken infektion du har, hur svår infektionen är samt på din ålder och kroppsvikt.

### Doseringsanvisning

Vanlig dos för vuxna och äldre barn är 1 tablett (1 gram) om dagen.

Du bör ta Cefadroxil Sandoz vid ungefär samma tidpunkt varje dag och i samband med måltid. Tabletterna sköljs ner med minst 1/2 glas vatten. Tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljning.

*Även om du känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att du tar hela Cefadroxil Sandoz-kuren enligt ordination.*

I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.



## **Vad händer om du tagit för stor dos?**

Kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

## **Vilka biverkningar kan Cefadroxil Sandoz ge?**

Vanlig (kan förekomma hos fler än 1 patient av 100): Magbesvär som diarré, magsmärtor, illamående, kräkningar och sura uppstötningar. Illamående kan motverkas om du tar läkemedlet i samband med måltid. Diarré kan lindras genom att man äter yoghurt någon gång per dag. Inflammation i tungan. Allergiska överkänslighetsreaktioner som hudutslag och klåda. Dessa är vanligast hos personer med andra typer av allergier. Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 patient av 1000): Pseudomembranös kolit (allvarlig tarminfektion). Svårare typer



av allergiska reaktioner med akut svullnad av hud och slemhinnor, läkemedelsrelaterad feber, serumsjukeliknande reaktioner, ledvärk, njurinflammation, vätskeansamling (ödem), svåra hud- och slemhinneinflammationer och blodtrycksfall. Nedsatt leverfunktion och leversvikt har rapporterats. Blodprover kan visa förändringar av blodkropparna (t ex agranulocytos) eller en ökad halt av leverenzymmer, vilket normaliseras efter avslutad behandling. Huvudvärk, yrsel, nervositet, sömnlöshet, trötthet. Svampinfektioner i underlivet och munnen. Vid hastigt uppkomna utslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas. Vid långvarig eller svår diarré och vid kraftig allergisk reaktion bör du också kontakta läkare.

Om Du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen

eller vattenkastningsbesvär, ska Du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

## **Hur ska Cefadroxil Sandoz förvaras?**

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras i originalförpackningen.

Fuktkänsligt.

Överbliven eller för gammal medicin bör du lämna till apotek för förstöring.

Senaste revision. 2006-07-20