



Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Viscotears®

Novartis Healthcare

Ögongel, endosbehållare 2 mg/g

Steril, klar och färglös flytande gel.

Tårsubstitut

Aktiv substans:

Karbomer

Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Receptfritt AD**Förmån**

ATC-kod:

S01XA20**Indikationer**

Tårsubstitut för behandling av torra ögon, inklusive keratokonjunktivitis sicca, (Sjögrens syndrom).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

1 droppe 3-4 gånger dagligen eller efter behov beroende på tillståndets svårighetsgrad. Viscotears appliceras i nedre konjunktivalsäcken.

Endosbehållaren är steril tills behållaren öppnats.

Varningar och försiktighet

Kontaktlinser skall uttagas före applicering av Viscotears och inte insättas igen förrän tidigast 30 minuter efter administreringen.

Interaktioner

Vid administrering av andra läkemedel i ögat skall Viscotears tillföras sist och tidigast 5 minuter efter andra ögonläkemedel.



Graviditet

Kan användas under graviditet och amning.

Amning

Kan användas under amning.

Trafik

Dimsyn kan uppstå temporärt. Detta bör beaktas då optimal synskärpa krävs, till exempel vid bilkörning.

Biverkningar

Ögon: Vanliga (>1/100): Lätt övergående ögonirritation, klibbiga ögonlock, dimsyn.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Överkänslighet, hyperemi i ögat, konjunktivalt ödem, ögonlocksödem, pruritus i ögat, ögonsmärta.

Överdoser

Inga kända reaktioner.

Farmakodynamik

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel vid ögonsjukdomar.

ATC-kod: S01X A20

Viscotears ögongel är en stabil gel innehållande karbomer.

Viscotears är ett tårsubstitut och innehåller inte någon substans med farmakologisk effekt.

Efter instillation fördelas gelen snabbt över ögats binde- och hornhinna och bildar en smörjande film med långvarig kontaktid (upp till 6 timmar).

Farmakokinetik

Farmakokinetiska data saknas.

På grund av karbomerens höga molekylvikt (4 milj. Dalton) är absorption och ackumulering i ögats vävnader osannolik.

Prekliniska uppgifter

Ej relevant

Innehåll

1 gram gel innehåller karbomer 2 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

Sorbitol (E 420), natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Ej relevant

Hantering, hållbarhet och förvaring

2 år.

Innehållet i en endosbehållare skall användas omedelbart efter att den har öppnats. Oanvänt innehåll skall inte sparas.

Förvaras vid högst 30⁰C. Förvaras i ytterkartongen.

Vrid av toppen på endosbehållaren. Undvik i varje sammanhang att beröra endosbehållarens spets. Dra ner det undre ögonlocket med ett finger. Böj huvudet bakåt. Tag endosbehållaren i den andra handen och tryck på den så, att en droppe gel faller i ögat. Viscotears ögongel i endosbehållare skall användas omedelbart efter att den har öppnats. Endosbehållaren skall kasseras efter användning.

Förpackningsinformation

Ögongel, endosbehållare 2 mg/g Steril, klar och färglös flytande gel.

30 x 0.6 milliliter endosbehållare, receptfri, AD (fri prissättning), 91:50, F

120 x 0.6 milliliter endosbehållare, receptfri, AD (fri prissättning), 229:50, F

Texten är baserad på produktresumé: 2010-02-09.