



## Atenolol Sandoz

25 mg, 50 mg respektive 100 mg tabletter

### **Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.**

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad är Atenolol Sandoz och vad används det för?
2. Innan du använder Atenolol Sandoz
3. Hur du använder Atenolol Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Atenolol Sandoz

### **Vad innehåller Atenolol Sandoz ?**

- Det aktiva innehållsämnet är atenolol 25 mg, 50 mg respektive 100 mg.
- Övriga innehållsämnen är povidon, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykollat, magnesiumstearat och kolloidal kiseldioxid.

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike

Vid frågor kontakta: Sandoz AB, Berga Allé 1E, 254 52 Helsingborg

## **1. VAD ÄR ATENOLOL SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?**

### **Läkemedlets utseende:**

25 mg: Vit, rund, bikonvex tablett med skåra på ena sidan. Tabletten är märkt "25" på den andra sidan. Diameter: 7 mm.

50 mg: Vita, runda bikonvexa tabletter. Ena sidan är märkt "50" och motsatt sida har en skåra. Diameter: 8 mm.

100 mg: Vita, runda bikonvexa tabletter. Ena sidan är märkt "100" och motsatt sida har en skåra. Diameter: 10 mm.



## Läkemedelsgrupp

Atenolol Sandoz är en så kallad selektiv betablockerare. Den har effekt särskilt på hjärtat och cirkulationen, medan andra organ påverkas mycket litet. Hjärtat påverkas på så sätt att det slår långsammare och pumpar ut mindre mängd blod per minut. Detta medför att blodtrycket sänks och att antalet anginaanfall (kärlekskramp i hjärtat) minskar. Atenolol Sandoz normaliserar även hjärtfrekvensen vid vissa rytmstörningar.

## Vad används Atenolol Sandoz för?

Atenolol Sandoz används för behandling av förhöjt blodtryck, för att motverka kärlekskramp i hjärtat (angina pectoris), för att ge regelbunden hjärtverksamhet samt för att skydda hjärtat efter en hjärtattack.

## 2. INNAN DU ANVÄNDER ATENOLOL SANDOZ

### Använd inte Atenolol Sandoz:

- om du är överkänslig (allergisk) mot atenolol eller något av övriga innehållsämnen i Atenolol Sandoz.
- om du har obehandlad hjärtsvikt eller hjärtblock (störning i hjärtats retledningssystem).
- om du har mycket långsam eller oregelbunden hjärtverksamhet.
- om du har mycket lågt blodtryck.
- om du har svår cirkulationsrubbing.
- om du har svåra andningsbesvär eller svår astma.
- om du har obehandlat feokromocytom (tumör i binjuremärgen).
- om du har hög halt av sura ämnen i kroppen t. ex vid svårbehandlad diabetes.
- om du behandlas med läkemedlet floktafenin.

Atenolol Sandoz ges ej till barn eftersom det inte finns tillräcklig erfarenhet.

### Var särskilt försiktig med Atenolol Sandoz

- om du har fönstertittarsjuka (claudicatio intermittens).
- om du har cirkulationsrubbingar, viss typ av kärlekskramp i hjärtat med nattliga besvär (Prinzmetal's angina) eller andra typer av hjärtbesvär.
- om du har nedsatt njurfunktion.
- om du har psoriasis.
- om du har diabetes.
- om du har giftstruma.



Du bör rådgöra med läkare innan behandling med Atenolol Sandoz påbörjas om du lider av något av ovanstående symtom eller sjukdomar.

Inför en operation under narkos skall läkaren informeras om att du använder Atenolol Sandoz eftersom dosen i vissa fall bör minskas innan operationen.

## **Barn**

Atenolol Sandoz ges ej till barn eftersom det inte finns tillräcklig erfarenhet.

## **Graviditet**

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Atenolol Sandoz under graviditet.

## **Amning**

Passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Atenolol Sandoz under amning.

## **Körförmåga och användning av maskiner**

Det finns ingen dokumentation som visar om Atenolol Sandoz påverkar förmågan att köra bil. I samband med för lågt blodtryck kan yrsel och trötthet uppträda som en biverkan. Detta kan man behöva ta hänsyn till i samband med bilkörning.

## **Användning av andra läkemedel**

Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Atenolol Sandoz. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering. Exempel på läkemedel som kan påverka eller påverkas av behandling med Atenolol Sandoz är:

Floktafenin. Medicin mot högt blodtryck och/eller hjärtbesvär som innehåller diltiazem, verapamil, klonidin, nifedipin eller amiodaron, hjärtmedicin som innehåller digitalis, vissa mediciner mot depression (MAO-hämmare utom MAO-B hämmare) eller mediciner som innehåller sultoprid bör ej användas samtidigt som Atenolol Sandoz. Vissa medel mot epilepsi (fenobarbital), läkemedel mot diabetes (insulin och orala antidiabetika), vissa läkemedel mot värk och feber, även receptfria (såsom ibuprofen), baklofen (muskelavslappande medel), adrenalin, medel mot depression (tricykliska antidepressiva) och vissa andra läkemedel mot psykiska problem (fentiaziner) och ampicillin kan påverka eller påverkas av behandling med Atenolol Sandoz

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.



### 3. HUR DU ANVÄNDER ATENOLOL SANDOZ

#### Doseringsanvisning

Använd alltid Atenolol Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna är 1 tablett 50-100 mg en gång per dag. Hos patienter med starkt nedsatt njurfunktion skall dosen minskas. Tabletterna bör tas vid samma tidpunkt varje dag.

#### Om du använder mera Atenolol Sandoz än du borde

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

#### Om du glömt ta Atenolol Sandoz

Om en dos blir bortglömd, bör man vänta att ta den vid den normala tidpunkten (ej dubbel dos).

#### Effekter som kan uppträda när behandling med Atenolol Sandoz avslutas

Om behandlingen med Atenolol Sandoz skall upphöra bör detta ske stegvis under 7-10 dagar. Ändra dock aldrig själv på dos som föreskrivits.

### 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Atenolol Sandoz ha biverkningar.

*Vanliga:* Trötthet, långsam puls, kalla händer och fötter, magbesvär (illamående, diarré).

*Mindre vanliga/sällsynta:* yrsel, särskilt när man reser sig, hjärtblock (onormala hjärtslag, yrsel, trötthet, svimning), försämring av blodcirkulation, domning eller kramper i fingrarna. Sömnrubbingar, förändring i sinnesstämning, ångest, förvirringstillstånd och hallucinationer. Muntorrhet, förstoppning, håravfall. Hudutslag - även förvärrande av psoriasis. Myrkrypningar i fingrarna, synstörningar, torra ögon, impotens, svettning, huvudvärk, ökade andningssvårigheter hos astmatiker, depression, huvudvärk, minskat antal blodplättar, minskat antal vita blodkroppar.

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.

### 5. FÖRVARING AV ATENOLOL SANDOZ

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen.



Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen

Överbliven eller för gammal medicin lämnas till apotek för förstöring.

**Denna bipacksedel godkändes senast den 2006-07-20**