



Loratadin Hexal

10 mg Tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt för att du skall kunna motverka lätta besvär utan läkarhjälp. Loratadin Hexal måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

Detta läkemedel är receptfritt. Loratadin Hexal måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Loratadin Hexal är och vad det används för
2. Innan du använder Loratadin Hexal
3. Hur du använder Loratadin Hexal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Loratadin Hexal ska förvaras
6. Övriga upplysningar

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad är Loratadin Hexal och vad används det för?
2. Innan du använder Loratadin Hexal
3. Hur du använder Loratadin Hexal
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Loratadin Hexal

Vad innehåller Loratadin Hexal ?

Det aktiva innehållsämnet är: Loratadin 10 mg.

Hjälpämnen är: Laktosmonohydrat, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.



Innehavare av godkännande för försäljning

Hexal A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Danmark.

Information lämnas av: Sandoz AB, Berga Allé 1E, 254 52 Helsingborg.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar

Tabletterna är förpackade i blisterkartor (PVC/Al), vilka ligger i en ask.

Förpackningsstorlekar: 10, 20 och 30 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

1. VAD ÄR LORATADIN HEXAL OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Vad används Loratadin Hexal för?

När du utsätts för ett allergiframkallande ämne utsöndrar din kropp histamin som sedan ger upphov till de allergiska besvären. Loratadin Hexal är ett antihistamin som motverkar effekten av histamin. Loratadin Hexal lindrar allergiska symtom såsom nysningar, rinnsnuva och klåda i näsan samt sveda och klåda i ögonen.

De allergiska besvären kan orsakas av bl a pollen, pälsdjur, kvalster och damm.

Pollenallergi är säsongsbunden till pollenperioderna. Allergi mot pälsdjur, kvalster eller damm kan man däremot råka ut för året runt och ska konstateras av läkare innan man börjar behandla sig. Denna typ av allergi kan behandlas tillfälligt vid behov.

Vanlig snuva, s k "förkylningssnuva" är orsakad av ett virus och då har inte antihistaminer någon effekt. Loratadin Hexal skall därför inte användas vid annan snuva än allergisk snuva.

Observera att läkaren kan ha ordinerat Loratadin Hexal för annat användningsområde än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination.

Loratadin som finns i Loratadin Hexal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. INNAN DU ANVÄNDER LORATADIN HEXAL

Använd inte Loratadin Hexal:

- om du är allergisk (överkänslig) mot loratadin eller mot något av övriga innehållsämnen i Loratadin Hexal.



Var särskilt försiktig med Loratadin Hexal

Tala med din läkare innan du påbörjar behandling med Loratadin Hexal om du lider av svår leversjukdom.

Loratadin Hexal innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Loratadin Hexal kan orsaka muntorrhet hos vissa patienter. God munhygien (tandborstning 2 gånger per dag med fluortandkräm) är viktig vid långtidsbehandling, eftersom muntorrhet kan öka risken för karies.

Behandlingen med Loratadin Hexal måste avbrytas minst 48 timmar innan du ska genomföra ett hudtest för konstaterande av allergi. Resultatet kan annars bli missvisande.

Graviditet

Använd inte Loratadin Hexal om du är gravid. Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Rådfråga alltid din läkare innan du använder detta läkemedel.

Amning

Använd inte Loratadin Hexal om du ammar. Loratadin Hexal går över i modersmjölken.
Rådfråga

alltid din läkare innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Enstaka personer kan reagera med trötthet på denna typ av läkemedel. Innan du kör bil eller utför

uppgifter som kräver skärpt uppmärksamhet måste du därför känna till hur du reagerar på medicinen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Loratadin Hexal

Loratadin Hexal innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.



Användning av andra läkemedel

Inga oönskade effekter har visat sig vid användning av andra läkemedel tillsammans med Loratadin Hexal. Du ska dock alltid tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana samt naturläkemedel eller naturprodukter.

3. HUR DU ANVÄNDER LORATADIN HEXAL

Doseringsanvisning

Vuxna och barn över 12 år med en kroppsvikt över 30 kg:

1 tablett (10 mg) en gång per dag.

Loratadin Hexal ska inte ges till barn under 12 år utan läkarkontakt eller till äldre barn med en kroppsvikt under 30 kg.

Behandlingens längd kan variera beroende på vilka symptom du har. Gör gärna ett försök att avsluta behandlingen om du tror att pollensäsongen för din del är över eller om det är mycket låga halter av pollen i luften. Använd Loratadin Hexal i högst 3 månader i följd om inte läkare föreskrivit annat.

Om du har allvarliga problem med levern bör dosen justeras – fråga din doktor om råd.

Tabletten bör sväljas ned tillsammans med ett glas vatten. Tabletten kan tas utan hänsyn till måltid. Loratadin Hexal kan orsaka muntorrhet hos vissa patienter. God munhygien (tandborstning 2 gånger per dag med fluortandkräm) är viktig vid långtidsbehandling, eftersom muntorrhet kan öka risken för karies.

Administrering

Tabletten bör sväljas ned tillsammans med ett glas vatten. Tabletten kan tas utan hänsyn till måltid.

Om du använder mera Loratadin Hexal än du borde

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt ta Loratadin Hexal

Om du glömmet att ta Loratadin Hexal ska du bara fortsätta med din vanliga dos, ta *inte* dubbel dos för att kompensera de doser som du glömt.



4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Loratadin Hexal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Trötthet, huvudvärk, nervositet, sömnhet.

Ökad aptit, sömnlöshet.

Allvarliga allergiska reaktioner, yrsel, oregelbunden hjärtverksamhet, illamående, muntorrhet, inflammation i magslemhinnan, onormal leverfunktion, hudutslag, håravfall.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV LORATADIN HEXAL

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Denna bipacksedel godkändes senast den 2010-01-14