

Famotidin Hexal

20 och 40 mg Filmdragerade tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad är Famotidin Hexal och vad används det för?
2. Innan du använder Famotidin Hexal
3. Hur du använder Famotidin Hexal
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Famotidin Hexal

Vad innehåller Famotidin Hexal ?

En tablett innehåller:

Verksamt ämne: Famotidin 20 mg eller 40 mg.

Övriga ämnen: Mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, makrogol 4000, magnesiumstearat, hypromellos, natriumstärkelseglykolat (typ A), vattenfri, kolloidal kiseldioxid, pregelatiniserad stärkelse, talk, titandioxid (färgämne E 171).



Innehavare av godkännande för försäljning

Hexal A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Danmark.

Information lämnas av: Sandoz AB, Berga Allé 1E, 254 52
Helsingborg.

1. VAD ÄR FAMOTIDIN HEXAL OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

20 mg: Vita, avlånga, bikonvexa tabletter med delskåra på ena sidan, ca 9x4,7 mm.

40 mg: Vita, avlånga, bikonvexa tabletter med delskåra på ena sidan, ca 12x6,2 mm.

Läkemedelsgrupp

Famotidin Hexal tillhör en grupp läkemedel som kallas H₂-receptorantagonister och som verkar genom att minska mängden syra som produceras i din mage.

Observera att läkaren kan ha ordinerat detta läkemedel för annat ändamål än det som angivits i bipacksedeln. Du ska alltid följa läkarens ordination och de anvisningar som finns på etiketten på förpackningen.

Vad används Famotidin Hexal för?

- Vid behandling av sår i magsäcken och tolvfingertarmen.
- Vid behandling av inflammatoriska tillstånd i matstrupen orsakade av sura uppstötningar för att förebygga allvarliga inflammatoriska tillstånd i matstrupen.



- Vid Zollinger-Ellisons syndrom, en sjukdom som karakteriseras av ovanligt stor produktion av magsyra.

2. INNAN DU ANVÄNDER FAMOTIDIN HEXAL

Använd inte Famotidin Hexal:

- Om du är allergisk mot famotidin eller mot något av de övriga ämnen.
- Om du ammar.

Var särskilt försiktig med Famotidin Hexal

- Famotidin Hexal kan dölja symptomen på ett elakartat tillstånd i magsäcken och därmed fördröja nödvändig behandling. Din läkare bör därför utesluta möjligheten att du har en sådan sjukdom, innan behandling med Famotidin Hexal påbörjas.
- Informera din läkare om du har njurproblem, för det kan då bli nödvändigt att ordinera lägre dos åt dig.
- Tabletterna innehåller laktos. Du bör inte använda Famotidin Hexal om du inte tål laktos, galaktos eller glukos.
- Om du tidigare har fått någon allergisk reaktion av andra läkemedel i samma klass (H₂-receptorantagonister) som Famotidin Hexal.

Graviditet

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Rådfråga din läkare.

Amning

Famotidin Hexal passerar över i modersmjölk. Famotidin Hexal ska inte användas under amningsperioden eftersom det finns risk att famotidin påverkar barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan.

Användning av andra läkemedel

Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Famotidin Hexal. Några av dessa läkemedel

är:

- Ketokonazol och itrakonazol (mot svamp).
- Probenecid (mot gikt).
- Antacida (syraneutraliserande medel). Om man tar antacida och famotidin samtidigt bör famotidin tas 1-2 timmar före antacida.
- Sukralfat (mot sår i magsäcken och tolvfingertarmen).

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, inklusive naturprodukter och naturläkemedel.

3. HUR DU ANVÄNDER FAMOTIDIN HEXAL

Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

VUXNA:

För sår i magsäcken och tolvfingertarmen:

Den vanliga dosen är 40 mg vid läggdags under 4-8 veckor.

Underhållsbehandling för att förebygga återkommande sår: 20 mg vid läggdags.

För inflammatoriska tillstånd i matstrupen orsakade av att magsyra stöts upp:



Den vanliga dosen är 20 mg två gånger per dag.

I svåra fall kan dosen ökas upp till 40 mg två gånger per dag under 6-8 veckor.

Under långtidsbehandling är den normala dosen 20 mg två gånger per dag. Behandlingen bör inte fortsätta längre än 6 månader.

Vid Zollinger-Ellisons syndrom:

Individuell dosering. Den vanliga startdosen är 20 mg var sjätte timme.

Vid nedsatt njurfunktion:

Vid allvarligt nedsatt njurfunktion kan dosen behöva minskas till hälften.

BARN:

Rekommenderas ej.

Administrering

Svälj medicinen tillsammans med ett stort glas vatten.

Tabletterna kan delas men får inte krossas eller tuggas.

Om du använder mera Famotidin Hexal än du borde

Om du har tagit för mycket Famotidin Hexal ska du kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Om du glömt ta Famotidin Hexal

Om du glömmer att ta Famotidin Hexal ska du bara fortsätta med din vanliga dos - ta *inte* dubbel dos för att kompensera de doser du har glömt.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Famotidin Hexal ge biverkningar.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Huvudvärk, yrsel, förstoppning, diarré.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Illamående, kräkningar, milda magsmärtor, svullnad, trötthet, muntorrhet, aptitlöshet, utslag, klåda.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Förändrade levervärden, gulsot, nässelutslag, allergiska reaktioner inklusive svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller hals, kraftig överkänslighetsreaktion, andningssvårigheter, ledsmärta.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

Minskning av antalet blodplättar, minskat antal blodkroppar, hallucinationer, förvirring, ångest, upphetsning, depression, impotens, minskad sexualdrift, myrkrypningar i huden, dåsighet, sömnlöshet, epileptiska anfall, håravfall, andnöd, allvarliga hudreaktioner, muskelkramper.

Om besvärande eller ovanliga reaktioner inträffar som du tror beror på Famotidin Hexal ska du kontakta din läkare.

5. FÖRVARING AV FAMOTIDIN HEXAL

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen.

Använd inte Famotidin Hexal efter det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen. Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven

eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Denna bipacksedel godkändes senast den 2008-03-13