

# Furosemid Hexal

40 mg Tabletter

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.**

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad är Furosemid Hexal och vad används det för?

2. Innan du använder Furosemid Hexal
3. Hur du använder Furosemid Hexal
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Furosemid Hexal

## **Vad innehåller Furosemid Hexal ?**

*Det aktiva innehållsämnet är:* Furosemid 40 mg.

*Övriga innehållsämnen är:* Mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat.

## **Innehavare av godkännande för försäljning**

HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre, Danmark.

*Information lämnas av:* Sandoz AB, Berga Allé 1E, 254 52 Helsingborg.

# **1. VAD ÄR FUROSEMID HEXAL OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?**

## **Läkemedlets utseende:**

Furosemid Hexal är en vit, rund, lätt välvd tablett med delningsskåra på en sida.

## **Läkemedelsgrupp**

Furosemid Hexal är ett urindrivande läkemedel snabb och kraftig verkan (loop-diuretikum).

Furosemid Hexal verkar genom att öka vätskeutsöndringen vid tillstånd av ökad vätskeansamling i kroppen. Detta kan medverka till att sänka blodtrycket, samt minska på vätskeansamlingar i kroppen.

## **Vad används Furosemid Hexal för?**

- Förhöjt blodtryck.
- Vätskeansamlingar i kroppen i samband med hjärt- eller leversjukdomar.

- Vätskeansamlingar i kroppen i samband med njursjukdomar.
- Vätskeansamlingar i lungorna.

Observera att läkaren kan ha ordinerat detta läkemedel för annat ändamål och/eller med annan dosering än den som anges här i bipacksedeln. Du ska alltid följa läkarens ordination och de anvisningar som finns på etiketten på förpackningen

## **2. INNAN DU ANVÄNDER FUROSEMID HEXAL**

### **Använd inte Furosemid Hexal:**

- Om du är överkänslig (allergisk) mot furosemid, besläktade ämnen (sk Sulfonamider) eller något av övriga innehållsämnen i tabletten.
- Om du har njursvikt och saknar urinproduktion.
- Om du har en svår leversjukdom.

- Om du har mycket låg koncentration av kalium eller natrium i blodet.
- Om du är mycket uttorkad.
- Om du ammar.

## **Var särskilt försiktig med Furosemid Hexal**

- Om du har lågt blodtryck.
- Om du har diabetes.
- Om du har gikt.
- Om du har problem med att urinera (t.ex. förstörd prostata, utvidgning av njurbäckenet eller förträngning i urinledarna).
- Om du har för lågt proteininnehåll i blodet (t.ex. vid sjukdomen nefrotiskt syndrom).
- Om du har problem med levern och får akuta problem med njurarna.
- Om läkaren har utvärderat att du p.g.a. vissa hjärt-/kärlbesvär inte skulle tåla ett eventuellt blodtrycksfall.

Du ska upplysa läkaren om detta innan behandlingen med Furosemid Hexal påbörjas.

Upplys alltid vid blodprovstagning och urinprovstagning att du behandlas med Furosemid Hexal.

Om du behandlas under en längre tid kan det hända att läkaren vill ta blodprov under behandlingens gång.

## **Intag av Furosemid Hexal med mat och dryck**

Tabletterna ska tas på fastande mage och tillsammans med ett stort glas vatten.

## **Graviditet**

Du får endast använda Furosemid Hexal efter läkarens anvisning.

## **Amning**

Om du ammar får du inte använda Furosemid Hexal, eftersom läkemedlet passerar över



i modersmjölken. Om behandlingen är nödvändig ska amningen upphöra.

## **Körförmåga och användning av maskiner**

Det kan inte uteslutas att användning av Furosemid Hexal kan ge biverkningar som i större eller mindre grad kan påverka förmågan att köra bil, att använda maskiner och att arbeta i osäker miljö.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.



## **Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Furosemid Hexal**

Furosemid Hexal innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

## **Användning av andra läkemedel**

De verksamma substanserna i vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Furosemid Hexal om de används samtidigt.

Några av dessa substanser är:

- Aminoglykosider (t.ex. kanamycin, gentamicin, tobramycin), cefalosporiner och polymyxiner (mot infektioner).
- Cisplatin, metotrexat och aminoglutetimid (cytostatika).
- Litium (vid manodepressiv sjukdom).
- Kortikosteroider (bl.a. mot giktsjukdomar).

- Karbenoxolon (mot magsår).
- Hjärtglykosider (hjärtmedicin)
- Terfenadin (mot allergi)
- Karbamazepin och fenytoin (mot epilepsi).
- Amfotericin (mot svampinfektion).
- Reboxetin (medel mot depression).
- Andra läkemedel mot förhöjt blodtryck, t.ex. ACE-hämmare.
- Teofyllin (mot astma).
- Curareliknande muskelavslappnande medel.
- Läkemedel mot diabetes.
- Pressoraminor som t.ex. adrenalin eller noradrenalin (bl.a. mot sviktande blodcirkulation).
- NSAID, t.ex. indometacin och acetylsalicylsyra (smärtstillande medel).
- Probenecid (mot gikt).
- Långvarig användning av laxermedel.

Sukralfat (mot sura uppstötningar och magsår) bör tas minst 2 timmar före eller efter Furosemid Hexal.

Även andra ämnen kan påverka effekten av behandling med Furosemid Hexal.

Lakrits i stora mängder kan medföra kaliumförlust vilket påverkar behandlingen.

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

### **3. HUR DU ANVÄNDER FUROSEMID HEXAL**

#### **Doseringsanvisning**

Dosen bestäms av din läkare, som avpassar den individuellt för dig. Ta alltid Furosemid Hexal enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotek om du är osäker.

*Vuxna:*



Vätskeansamlingar i kroppen i samband med hjärt- eller leversjukdomar:

Startdosen är vanligen ½-1 tablett (20-40 mg). Vid behov kan dosen ökas gradvis. Följ läkarens anvisningar. Underhållsbehandlingen är normalt 1-2 tabletter dagligen (40-80 mg).

Vätskeansamlingar i kroppen i samband med njursjukdomar:

Startdosen är vanligen 1 tablett (40 mg).

Dosen kan ökas gradvis. Följ läkarens anvisningar.

Underhållsdosen är normalt 1-2 tabletter dagligen (40-80 mg).

*Förhöjt blodtryck:*

1 tablett en gång dagligen (40 mg). I allvarliga fall upp till 60 mg dagligen. Följ läkarens anvisningar.

*Barn:*

2 mg furosemid per kg kroppsvikt och dygn.  
Följ läkarens anvisningar. Den maximala  
dosen är 40 mg per dag.

Ändring eller avslutning av behandlingen bör  
endast ske i samråd med läkare.

## **Administrering**

Tabletterna ska tas på fastande mage och  
tillsammans med ett stort glas vatten.

## **Om du använder mera Furosemid Hexal än du borde**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel  
kontakta alltid läkare, sjukhus eller  
Giftinformationscentralen (tel. 112) för  
bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering är t.ex. lågt  
blodtryck, starkt ökad urinering, förlamning,  
apati och förvirring.

## Om du glömt ta Furosemid Hexal

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

### 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Furosemid Hexal ha biverkningar.

#### **Allvarliga biverkningar:**

*Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):*

Minskat antal blodplättar.

*Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):*

Njurinflammation. Akut, svår överkänslighetsreaktion med symtom som hög puls, lågt blodtryck, andningsbesvär och eventuellt kramper. Kontakta genast läkare eller sjukhus. Ring eventuellt 112.

*Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare):*

Blodbrist, brist på en typ av vita blodkroppar (agranulocytos), akut inflammation i bukspottskörteln.

Furosemid Hexal kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinerings.

Dessutom kan följande allvarliga biverkning förekomma: cirkulatorisk kollaps (kraftigt blodtrycksfall medförande otillräcklig cirkulation).



## **Övriga biverkningar:**

*Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):*

Reaktioner i hud och slemhinnor t.ex. klåda, blåsförmade utslag, nässelfeber, små blödningar, diffust röda utslag särskilt i ansikte, på armar och ben och i munnens slemhinnor (erythema multiforme), svår hudinflammation med fjällning, hudreaktioner i samband med solbestrålning.

Dessutom kan följande biverkningar förekomma: Störningar i salt- och vätskebalans, ökat innehåll av urinämne, kolesterol, fettämnen eller socker i blodet, cirkulationsproblem, ändringar i blodbilden, urineringsproblem.

*Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):*

Illamående, kräkningar, diarré, kärlinflammation, öronsusningar och

övergående hörselnedsättning, myrkrypningar, muskelkramper, feber.

*Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 10000 användare):*

gallstas, ökning av leverenzymmer.

Om du får besvärande biverkningar eller upplever några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, kontakta läkare eller apotek.

## **5. FÖRVARING AV FUROSEMID HEXAL**

Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte Furosemid Hexal efter det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen efter Utg.dat.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

**Denna bipacksedel godkändes senast  
den 2006-09-07**